ENGERIX

Alergické reakce
Pokud máte alergickou reakci, ihned vyhledejte svého lékaře. Příznaky mohou zahrnovat:
- otok obličeje;
- nízký krevní tlak;
- obtíže s dýcháním;
- modravé zbarvení kůže;
- ztrátu vědomí.

Tyto příznaky se obvykle objevují velmi brzy po podání injekce. Z tohoto důvodu musí pacient zůstat 30 minut po očkování pod lékařským dohledem.
Pokud se příznaky objevily až po odchodu ze zdravotnického zařízení, navštivte ihned lékaře.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 dávek očkovací látky)
- bolest hlavy (vakcína Engerix-B 10 mikrogramů);
- bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce;
- únava;
- podrážděnost.

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 dávek očkovací látky)
- bolest hlavy (vakcína Engerix-B 20 mikrogramů);
- ospalost;
- nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení;
- průjem a bolest břicha;
- ztráta chuti k jídlu;
- vysoká tělesná teplota (horečka);
- celkový pocit nevole;
- otok v místě vpichu injekce;
- reakce v místě vpichu injekce (např. tvrdé zduření).

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 dávek očkovací látky)
- závrať;
- bolest svalů;
- příznaky podobné chřipkovým.

Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1 000 dávek očkovací látky)
- otok lymfatických uzlin;
- kopřivka, vyrážka, svědění;
- bolest kloubů;
- mravenčení.

Nežádoucí účinky hlášené po uvedení očkovací látky Engerix-B na trh zahrnují:
- snadnou tvorbu modřin a neschopnost zastavit krvácení po říznutí;
- nízký krevní tlak;
- zánět krevních cév;
- náhlý otok obličeje kolem úst a hrdla (angioneurotický edém);
- neschopnost pohybovat svaly (ochrnutí);
- zánět nervů (neuritidu), který může vést k pocitům necitlivosti, včetně dočasného zánětu nervů, který způsobuje bolest, slabost a ochrnutí končetin a často postupuje na hrudník a obličej (syndrom Guillain-Barré), onemocnění očních nervů (optickou neuritidu) a roztroušenou sklerózu;
- problémy s pohybem rukou a nohou (neuropatie);
- zánět mozku (encefalitidu);
- degenerativní onemocnění mozku (encefalopatii);
- zánět mozku (meningitidu);
- křeče (záchvaty);
- ztrátu citlivosti pro bolest a dotyk (hypestézii);
- růžové nebo červenavé bulky na kůži (lichen planus);
- červené nebo růžové skvrny na kůži;
- bolestivé a ztuhlé klouby (artritidu);
- svalovou slabost.