VAXIGRIP

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte alergickou reakci, okamžitě kontaktujte lékaře nebo zdravotníka nebo jděte na pohotovost v nejbližší nemocnici.

Alergické reakce

Mohou se objevit bezprostředně po podání vakcíny a mohou být život ohrožující.

Příznaky mohou zahrnovat:

- vyrážka, svědění, potíže s dýcháním, dušnost, otok obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka, nízký krevní tlak, bušení srdce a slabý puls, pocit chladu, vlhká kůže, závratě, slabost nebo mdloby (anafylaktická reakce, angioedém, šok).

Další příznaky mohou zahrnovat:

- oblasti svědící, červené, oteklé a popraskané kůže (atopická dermatitida), zrudnutí, návaly horka, krev v očním bělmu (oční hyperemie), zarudnutí a podráždění oka (konjunktivitida), podráždění krku, bolest v krku, podráždění uvnitř nosu, rýma, kýchání, ucpaný nos, dutiny nebo hrdlo, necitlivost nebo pocit mravenčení v ústech (orální parestezie), vyrážka v ústech (vyrážka na sliznici dutiny ústní), astma.

Tyto alergické reakce byly hlášeny jako méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) až vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob).

Další nežádoucí účinky hlášené u dospělých a starších pacientů

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů):

- Bolest hlavy, bolest svalů, celkový pocit nemoci (malátnost)[1], bolest v místě injekce.

[1] Časté u starších pacientů

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):

- Horečka[2], třes, reakce v místě injekce: zarudnutí (erytém), zatvrdnutí (indurace), otok.

[2] Méně časté u starších pacientů

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů):

- Otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech (lymfadenopatie)[3], neobvyklá slabost[3], únava, ospalost[4], závrať[4], zvýšené pocení (hyperhidróza)[3], bolesti kloubů[3], průjem, pocit na zvracení (nauzea), reakce v místě injekce: tvorba modřin, svědění, pocit horka, nepohodlí.

[3] Vzácné u starších pacientů

[4] Vzácné u dospělých

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů):

- Necitlivost nebo pocit mravenčení (parestezie), zvracení, snížená chuť k jídlu, onemocnění podobné chřipce.
- Snížení citlivosti (hypestezie), bolest břicha, alergie v místě injekce: pozorováno pouze u dospělých.
- Odlupovaná kůže (exfoliace) v místě injekce: pozorováno pouze u starších pacientů.