FSME

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

**Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)**

- bolesti v místě vpichu injekce

**Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)**

- bolest hlavy
- nevolnost
- bolesti svalů a kloubů
- únava a pocit nemoci

**Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)**

- zduření mízních uzlin
- zvracení
- horečka
- modřiny v místě vpichu

**Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)**

- alergické reakce
- ospalost nebo rozespalost
- kinetóza
- průjem
- bolest břicha
- zarudnutí, ztvrdnutí podkoží, otok, svědění, mravenčení a horkost v místě vpichu

**Následující další nežádoucí účinky ze sledování po uvedení na trh byly hlášeny se vzácnou frekvencí:**

- pásový opar
- spuštění autoimunních onemocnění, např. roztroušená skleróza
- alergické reakce
- neurologická onemocnění jako encefalomyelitida, zánět míchy (myelitida, transverzální myelitida)
- onemocnění projevující se svalovou slabostí, abnormálním čitím, brněním v pažích, nohou a horní části těla (syndrom Guillain-Barré)
- zánět mozku, záchvaty, zánět mozkových blan (obal pokrývající mozek)
- známky meningeálního dráždění jako je bolest a ztuhlost šíje
- neurologické příznaky jako je faciální paréza, ochrnutí, zánět nervů, abnormální nebo snížená citlivost jako je brnění a znecitlivění, bodavá nebo pulzující bolest podél jednoho nebo více nervů, zánět očního nervu
- závratě
- poruchy zraku/zhoršení, nebo přecitlivělost na světlo, bolest očí
- zvonění v uchu
- zrychlená tepová frekvence
- dušnost
- kožní reakce (vyrážka a/nebo svědění kůže), dermatitida, zarudnutí kůže, zvýšené pocení, zánět kůže
- bolest v zádech, otoky kloubů, bolest šíje, muskuloskeletální ztuhlost a ztuhlost šíje, bolest rukou a nohou
- zimnice, onemocnění podobné chřipce, slabost, edém, nejistá chůze, nahromadění podkožní tekutiny
- bolest kloubů v místě vpichu, zduření uzlin a zánět v místě vpichu