VARILRIX

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout po očkování touto vakcínou:

- Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)
  - bolest a zarudnutí v místě injekce.
- Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
  - vyrážka (skvrny a/nebo puchýře);
  - zduření v místě injekce*;
  - horečka 38 °C nebo vyšší (měřená v konečníku)*.
- Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)
  - infekce horních cest dýchacích;
  - bolest v krku a obtížné polykání (faryngitida - zánět hltanu);
  - otok lymfatických uzlin;
  - podrážděnost;
  - bolest hlavy;
  - spavost;
  - kašel;
  - svědění v nose, výtok z nosu, ucpaný nos, kýchání (rhinitida - rýma);
  - pocit na zvracení;
  - zvracení;
  - vyrážka podobná planým neštovicím;
  - svědění;
  - bolest kloubů;
  - bolest svalů;
  - horečka vyšší než 39,5 °C (měřená v konečníku);
  - nedostatek energie (únava);
  - pocit, kdy se celkově necítíte dobře.
- Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)
  - zánět oka (konjunktivitida - zánět spojivek);
  - bolest břicha;
  - průjem;
  - svědivá vystouplá vyrážka (kopřivka).

* Ke zduření v místě injekce a horečce může velmi často dojít u dospívajících a dospělých. Ke zduření také velmi často může dojít po podání druhé dávky u dětí mladších 13 let.
Po uvedení vakcíny Varilrix na trh byly v několika případech pozorovány následující nežádoucí účinky:

- pásový opar (herpes zoster);
- drobné krvácení nebo snadněji než normálně se tvořící modřiny v důsledku poklesu počtu krevních destiček;
- alergické reakce. Vyrážka, který může být svědivá nebo s výsevem puchýřů, otok očí a tváře, potížemi s dýcháním, nebo polykáním, náhlý pokles tlaku a ztráta vědomí. Tyto příznaky se mohou objevit ještě před odchodem z ordinace. Pokud pozorujete kterýkoliv z uvedených příznaků u sebe nebo Vašeho dítěte, ihned kontaktujte lékaře.
- infekce nebo zánět mozku, míchy a periferních nervů vedoucí k dočasným obtížím při chůzi (vrávorání) a/nebo ztrátě kontroly při tělesném pohybu, mozková mrtvice (poškození mozku v důsledku přerušení krevního zásobení);
- křeče nebo záchvaty;
- zánět, zúžení nebo ucpání cév. Může se projevit neobvyklým krvácením nebo tvorbou podkožních modřin (Henoch-Schönleinova purpura), nebo horečkou, která trvá více než 5 dní, je spojena s kopřivkou na trupu, někdy následována olupováním kůže na dlaních a prstech, zarudnutím očí, rtů, krku a jazyka (Kawasakiho nemoc).
- erythema multiforme (příznaky jsou červená, často svědivá místa, podobná vyrážce při spalničkách, která se začínají objevovat na končetinách a někdy na tváři a zbytku těla).